


POLSKA cabines

Świat kosmetyki profesjonalnej - beauty, spa & wellness



médika

Laser VLight

Skuteczny sposób
na popękane naczynka



nawilżenie pochwy. Jest nieinwazyjny i przeznaczony dla kobiet w każdym wieku.

Wskazania do zabiegu

Metoda wykonywana urządzeniem TerMiVa ma amerykańskie certyfikaty FDA do stosowania w dermatologii. Potwierdzona jest jej skuteczność w leczeniu atrofii pochwy i warg sromowych, wysiłkowego nietrzymania moczu, nadreaktywnego pęcherza moczowego, suchości pochwy, zaburzeń orgazmu. Stosowana jest również ze względów estetycznych.

Procedura zabiegowa

Zabieg jest bezbolesny, nie wymaga zastosowania znieczulenia, pacjentka odczuwa wyłącznie delikatne, miłe ciepło. Polega on na przesuwaniu odpowiednią techniką głowicy zabiegowej, która ma kształt profilowanej bagietki laboratoryjnej. Głowica podnosi temperaturę tkanek do 42–45°C.

Poprawa występuje po miesiącu do trzech po wykonaniu zabiegu. Pacjentki zaczynają odczuwać pierwszy korzystny wpływ zabiegu około dwóch tygodni po wykonaniu pierwszej procedury. Optymalne efekty uzyskiwane są po 2 lub 3 zabiegach. Czas utrzymywania się lepszej kondycji tkanek to okres około 9–12 miesięcy (terapia pochwy), 4–6 miesięcy (terapia warg sromowych).

Efekty okołozabiegowe

Po zabiegu wykonanym na wargach sromowych większą skórą może być zaróżowiona lub zaczerwieniona, obrzmiała i ciepła przy dotyku przez godzinę. Może wystąpić nieznaczny przykurcz, który powinien ustąpić w ciągu 24 godzin. Tuż po zabiegu mogą się pojawić delikatne plamki o charakterze naczyniowym. W prawidłowej procedurze nie istnieje potrzeba rekonwalescencji. Nie ma ograniczeń aktywności fizycznej. Nie trzeba zachowywać wstrzemięźliwości seksualnej. Nie istnieją ograniczenia kąpielii.

Zabiegi z użyciem nici liftingujących

Nici liftingujące Aptos „do zadań specjalnych” mają zastosowanie w zabiegach estetycznych stref intymnych (ginekologii estetycznej). Ich podstawowym zadaniem jest zmniejszenie wejścia do pochwy, jak również jej rewitalizacja i przywrócenie naturalnego napięcia mięśni krocza. Wszystkie te małoinwazyjne zabiegi obszarów intymnych z pomocą nici nie tylko poprawiają estetykę krocza i sromu, ale także wpływają na samopoczucie kobiet i satysfakcję seksualną obojga partnerów.

Wskazania zabiegowe

Oslabienie mięśni krocza z wiekiem lub na skutek np. trudnych porodów i wynikające z tego powodu częste dysfunkcje zdrowotne: uczucie luzu w pochwie, infekcje, otarcia czy brak satysfakcji seksualnej; alternatywa do chirurgicznej korekcji pochwy.

Procedura zabiegowa

Zabieg wykonywany jest w warunkach ambulatoryjnych, w znieczuleniu miejscowym. Czas przeprowadzenia procedury z przygotowaniem


to około godziny. Po zabiegu należy zachować wstrzemięźliwość seksualną przez około 14 dni. Efekty mechanicznego oddziaływania nici to okres dwóch lat, natomiast biostymulacyjne działanie powodujące poprawę sprężystości i zagęszczenie struktur białkowych jest procesem ciągłym.

Przeciwwskazania do zabiegu

- ciąża i karmienie piersią
- miesiączka
- infekcje dróg rodnych
- nieprawidłowy wynik cytologii
- choroby nowotworowe
- choroby autoimmunologiczne
- cukrzyca
- urazy w strefie zabiegowej.

Przy ciągle powiększającej się ofercie zabiegów, również z zakresu estetyki ginekologicznej, należy pamiętać, że zdrowie jest priorytetem, a systematyczne badania profilaktyczne przyczyniają się do zachowania piękna na długie lata. ■

* Academy of Aesthetic and Anti-Aging Medicine; 3/2016.



Nici liftingujące Aptos „do zadań specjalnych” mają zastosowanie w zabiegach estetycznych stref intymnych (ginekologii estetycznej).